CALENDÁRIO DE VOOS NUPCIAIS

# Turquia

13 espécies com ficha e os meses em que as rainhas voam.




| ESPÉCIE | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | HORÁRIO | CLIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Camponotus lateralis*** | | | | ■ | ■ | | | | | | | | Tarde | ☼ 🍃 |
| ***Camponotus fallax*** | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | Tarde | ☼ |
| ***Manica rubida*** | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | Manhã | ☼ |
| ***Tetramorium immigrans*** | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | Manhã | 🍃 💧 |
| ***Pheidole pallidula*** Formiga-cabeçuda | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| ***Colobopsis truncata*** | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | Noite | |
| ***Plagiolepis pygmaea*** | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| ***Temnothorax unifasciatus*** | | | | | | | ■ | ■ | | | | | Manhã | |
| ***Aphaenogaster subterrane...*** | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | Fim de tarde | |
| ***Lasius alienus*** | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| ***Solenopsis fugax*** | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | Tarde | ☼ |
| ***Messor wasmanni*** | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | 🌧 |
| ***Messor ebeninus*** | | | | | | | | | | | ■ | ■ | Manhã | 🌧 |

## Como identificar uma revoada

1. As revoadas começam em dias quentes e sem vento, muitas vezes na primeira tarde de sol depois da chuva.
2. Olhe em calçadas, muros e gramados: rainhas e machos alados saem de pequenos buracos, cercados de operárias agitadas.
3. Rainhas que perderam as asas já foram fecundadas: são elas que você deve coletar para começar uma colônia.
4. Verifique antes as regras locais e colete só algumas rainhas: a maioria das espécies voa por vários dias.

Iniciante · Depois da chuva · Dias quentes · Ar úmido · Tempo calmo

Meses para a Europa temperada e o Mediterrâneo. O clima decide os dias exatos, então os voos podem acontecer mais cedo ou mais tarde onde você mora.

Veja o que está voando este mês, com fotos e fichas:
**brumaants.com/pt/nuptial-flights**

Escaneie para ver todas as espécies deste país

BRUMA ANTS