

Aphaenogaster senilis

Mayr, 1853

Eine langbeinige, rastlose Jägerin, die sich durch Koloniespaltung statt durch Flüge ausbreitet und flüssiges Futter auf kleinen Bröckchen nach Hause trägt.



Foto: Diego González Dopico, CC BY 4.0



Auf einen Blick



NESTTEMPERATUR

21–27 °C

Im Nest



LUFTFEUCHTIGKEIT IM NEST

50–65 %

Im Nest



ÜBERWINTERUNG

12–16 °C

Dez – Feb



HOCHZEITSFLÜGE

Keine Flüge

Koloniespaltung



ARBEITERINNEN

5–7 mm

Alle gleich groß



KÖNIGIN

8–10 mm

Eine Königin



KOLONIEGRÖSSE

Erreicht 3.000 Arbeiterinnen

Wachstum: Schnell



AUSBRUCHSRISIKO

Mittel

Bring an der Arena eine Ausbruchschutz-Barriere an




Das Jahr im Überblick



Monate für das gemäßigte Europa und den Mittelmeerraum. Das Wetter entscheidet über den genauen Zeitpunkt, deshalb kann es bei dir früher oder später so weit sein.



Größen im selben Maßstab



Pflege im Überblick

FUTTER

Insekten

Zucker

BESTE NESTER

1. Ytong-Nest
2. Naturnahes Setup
3. Acrylnest

WARUM DIESE BEWERTUNG

- ⚠ Neugierige Arbeiterinnen: Bring an der Arena eine Ausbruchschutz-Barriere an
- ⚠ Die Arbeiterinnen können stechen



Hinweise von Ameisenhaltern

TIPP

Biete flüssiges Futter zusammen mit ein paar Sandkörnern oder winzigen Schwammstücken daneben an. Die Arbeiterinnen können Flüssigkeit nicht von Mund zu Mund weitergeben, deshalb tranken sie diese Teilchen und tragen sie zur Königin und zur Brut; ein Halter sah stattdessen, dass einfache Schälchen unter Moos und Substrat begraben wurden.

ACHTUNG

Es gibt keinen Hochzeitsflug, und die Königinnen gründen keine Kolonien allein, deshalb wird die Art als Teilkolonie mit Königin, Arbeiterinnen und Brut verkauft. Leere das Reagenzglas beim Umzug in die Arena aus, statt es an das neue Nest anzuschließen, denn die Arbeiterinnen können sich bei einem Umzug gegenseitig angreifen.