

Aphaenogaster senilis

Mayr, 1853

Una cazadora inquieta y de patas largas que se expande dividiendo su colonia en lugar de volar y que lleva el alimento líquido al nido sobre trocitos de residuos.



Foto: Diego González Dopico, CC BY 4.0

De un vistazo



TEMPERATURA DEL NIDO
21–27 °C

En el nido



HUMEDAD DEL NIDO
50–65 %

En el nido



HIBERNACIÓN
12–16 °C

dic – feb



VUELOS NUPCIALES
Sin vuelos

Fisión de la colonia



OBreras
5–7 mm

Todas del mismo tamaño



REINA
8–10 mm

Una sola reina



TAMAÑO DE LA COLONIA
Llega a 3000 obreras


Crecimiento: Rápido



RIESGO DE FUGA
Medio

Pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo

El año de un vistazo



Meses válidos para la Europa templada y el Mediterráneo. El tiempo decide el momento exacto, así que, según dónde vivas, puede adelantarse o retrasarse.

Tamaños a la misma escala



Cuidados de un vistazo

ALIMENTACIÓN

Insectos

Azúcar

MEJORES NIDOS

1. Nido de Ytong
2. Montaje naturalista
3. Nido de acrílico

POR QUÉ ESTA VALORACIÓN

- ⚠️ Obreras curiosas: pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo
- ⚠️ Las obreras pueden picar

Notas de criadores

CONSEJO

Ofrece el alimento líquido con unos granos de arena o unos trocitos diminutos de esponja al lado. Las obreras no pueden pasarse el líquido de boca en boca, así que empapan esos trocitos y los llevan a la reina y a la cría, y un criador vio que los platitos sin estos añadidos acababan enterrados bajo el musgo y el sustrato.

ATENCIÓN

No hay vuelo nupcial y las reinas no fundan colonias en solitario, así que la especie se vende como un fragmento de colonia con una reina, obreras y cría. Cuando la traslades, vacía el tubo en la zona de forrajeo en lugar de conectarlo al nido nuevo, porque las obreras pueden atacarse entre sí durante un traslado.