

Camponotus cruentatus

(Latreille, 1802)

Hormiga maderera

Un gigante mediterráneo de un negro mate con una banda rojo óxido que cruza el gáster, tímido mientras es pequeño y ferozmente territorial cuando la colonia crece.



Foto: Jonghyun Park, CC BY 4.0

De un vistazo



TEMPERATURA DEL NIDO

25–30 °C

En el nido



HUMEDAD DEL NIDO

40–60 %

En el nido



HIBERNACIÓN

10–15 °C

nov – feb



VUELOS NUPCIALES

jun – jul

Días calurosos, Tiempo en calma



OBRERAS

6–10 mm

obreras mayores de hasta 15 mm



REINA

15–18 mm

Una sola reina



TAMAÑO DE LA COLONIA

Llega a 3000 obreras

Crecimiento: Rápido




RIESGO DE FUGA

Medio

Pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo




El año de un vistazo



Meses válidos para la Europa templada y el Mediterráneo. El tiempo decide los días exactos, así que, según dónde vivas, los vuelos pueden adelantarse o retrasarse.



Tamaños a la misma escala



Cuidados de un vistazo

ALIMENTACIÓN

Azúcar

Insectos

MEJORES NIDOS

1. Nido de Ytong
2. Nido de acrílico
3. Montaje naturalista

POR QUÉ ESTA VALORACIÓN

- ✓ Totalmente claustral: la reina no necesita comida hasta que llegan sus primeras obreras
- ⚠ Obreras curiosas: pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo



Notas de criadores

CONSEJO

Ofrece un extremo cálido y otro más fresco, por ejemplo con una manta térmica a lo largo de un lado del nido. La colonia traslada su cría al calor, y varios criadores vieron cómo el desarrollo se estancaba en un nido que se mantenía fresco.

ATENCIÓN

Mantén seca la zona de forrajeo y da al nido una cámara húmeda. Los criadores perdieron obreras y tuvieron moho en nidos que se regaban demasiado a menudo, aunque un criador culpó a un nido casi seco de que su reina pusiera muy pocos huevos, y humedecerlo de nuevo ayudó.