

Camponotus vagus

(Scopoli, 1763)

Un gigante rápido, peludo y de un negro mate que corre a toda velocidad sobre la madera muerta calentada por el sol y avasalla a sus vecinas junto a la comida.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

De un vistazo



TEMPERATURA DEL NIDO

22–28 °C

En el nido



HUMEDAD DEL NIDO

50–60 %

En el nido



HIBERNACIÓN

5–10 °C

oct – mar



VUELOS NUPCIALES

abr – jun

Días calurosos, Tiempo en calma



OBRERAS

6–12 mm

obreras mayores de hasta 13 mm



REINA

14–16 mm

Una sola reina



TAMAÑO DE LA COLONIA

Llega a 2000 obreras

Crecimiento: Moderado




RIESGO DE FUGA

Alto


Maestras de la fuga: usa una zona de forrajeo cerrada y una buena barrera

El año de un vistazo



Meses válidos para la Europa templada y el Mediterráneo. El tiempo decide los días exactos, así que, según dónde vivas, los vuelos pueden adelantarse o retrasarse.

Tamaños a la misma escala



Cuidados de un vistazo

ALIMENTACIÓN

Azúcar

Insectos

MEJORES NIDOS

1. Nido de madera
2. Nido de Ytong
3. Montaje naturalista

POR QUÉ ESTA VALORACIÓN

- ✓ Totalmente claustral: la reina no necesita comida hasta que llegan sus primeras obreras
- ⚠ Una auténtica maestra de la fuga que necesita un montaje antifugas
- ⚠ Necesita una hibernación en frío, por ejemplo en la nevera

Notas de criadores

CONSEJO

No mojes la madera ni el corcho del propio nido. Da el agua en la zona de forrajeo o en un tubo de ensayo: las obreras la toman por sí mismas y la llevan a los lugares que quieren humedecer, mientras que un nido que se mantiene demasiado mojado se llena de moho.

ATENCIÓN

Son trepadoras rápidas y fuertes que pueden saltar pequeños huecos y roer material blando de nido y plástico, así que usa una tapa que ajuste bien y revisa con regularidad los tubos de conexión y las uniones. La gruesa tapa de plexiglás de un criador incluso se deformó en los bordes en una zona de forrajeo húmeda y dejó de sellar.