

Carebara diversa

(Jerdon, 1851)

Una merodeadora que ataca en grupo, cuyas columnas de obreras diminutas y mayores de cabeza gigante parecen hormigas legionarias, con las obreras más pequeñas viajando a cuestras de las más grandes.



Foto: Jonghyun Park (clurarit), CC BY 4.0

De un vistazo



TEMPERATURA DEL NIDO

26–30 °C

En el nido



HUMEDAD DEL NIDO

60–80 %

En el nido



HIBERNACIÓN

No necesaria



VUELOS NUPCIALES

Aún sin datos

Tras la lluvia



OBRERAS

2–9 mm

obreras mayores de hasta 15 mm



REINA

19–25 mm

Una o varias reinas



TAMAÑO DE LA COLONIA

Llega a 10.000 obreras

Crecimiento: Rápido



RIESGO DE FUGA

Alto

Maestras de la fuga: usa una zona de forrajeo cerrada y una buena barrera

El año de un vistazo

Temporada activa



Meses en el área de distribución natural de la especie. El tiempo decide los días exactos, y las colonias criadas en casa pueden seguir otro ritmo.

Tamaños a la misma escala

Obreras

2–9 mm

Mayores

≤ 15 mm

Reina

19–25 mm

0 5 10 15 20 25

Cuidados de un vistazo

ALIMENTACIÓN

Insectos

Azúcar

MEJORES NIDOS

1. Montaje naturalista
2. Nido de Ytong

POR QUÉ ESTA VALORACIÓN

- ✓ Totalmente claustral: la reina no necesita comida hasta que llegan sus primeras obreras
- ✓ Sin hibernación que gestionar
- ⚠ Una auténtica maestra de la fuga que necesita un montaje antifugas
- ⚠ Necesita calor constante todo el año
- ⚠ Las colonias se vuelven enormes y necesitan espacio para expandirse

Notas de criadores

CONSEJO

Dales un nido profundo de tierra, o una mezcla de tierra y Ytong, que se mantenga húmedo pero bien ventilado, y deja que las hormigas lo caven y lo modelen por sí mismas. Mantén al menos una cámara siempre mojada, porque una colonia reseca puede morir en un día, y hierve antes la tierra de jardín para evitar ácaros y moho.

ATENCIÓN

No empieces con poco. Los criadores cuentan que las reinas solas son muy difíciles de sacar adelante y que las colonias de solo unos pocos cientos de obreras suelen prosperar los primeros meses y luego se apagan al cabo de casi un año, porque las menores, de vida corta, dejan de ser reemplazadas, así que una colonia ya establecida con mucha cría es el comienzo más seguro.