

Harpegnathos venator

(Smith, 1858)

Una cazadora de vista aguda y mandíbulas en forma de hoz que se queda inmóvil, agita el gáster y luego salta sobre su presa viva.



Foto: portioid, CC BY 4.0

De un vistazo



TEMPERATURA DEL NIDO

24–28 °C

En el nido



HUMEDAD DEL NIDO

60–80 %

En el nido



HIBERNACIÓN

No necesaria



VUELOS NUPCIALES

Aún sin datos

Tras la lluvia



OBRERAS

14–18 mm

Todas del mismo tamaño



REINA

16–20 mm

Una o varias reinas



TAMAÑO DE LA COLONIA

Llega a 400 obreras

Crecimiento: Moderado



RIESGO DE FUGA

Medio

Pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo



El año de un vistazo

Temporada activa



Meses en el área de distribución natural de la especie. El tiempo decide los días exactos, y las colonias criadas en casa pueden seguir otro ritmo.



Tamaños a la misma escala

Obreras

14–18 mm

Reina

16–20 mm

0 5 10 15 20



Cuidados de un vistazo

ALIMENTACIÓN

Insectos

MEJORES NIDOS

1. Nido de Ytong
2. Montaje naturalista
3. Montaje en tubo de ensayo

POR QUÉ ESTA VALORACIÓN

- ✓ Sin hibernación que gestionar
- ⚠ Obreras curiosas: pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo
- ⚠ Semiclaustral: hay que alimentar a la reina fundadora
- ⚠ Necesita calor constante todo el año
- ⚠ Las obreras pueden picar



Notas de criadores

CONSEJO

Dale al nido un calor constante y cámaras húmedas, y mantén más seca la zona de forrajeo. Los criadores que se fiaron de una temperatura ambiente fresca cuentan que la cría se desarrolló despacio y que las pupas fueron abiertas y devoradas antes de salir, mientras que la mayoría de los informes recientes de colonias sanas usan un nido calentado o una habitación cálida.

ATENCIÓN

Ofrece solo presas vivas. En una prueba de campo, las obreras no atacaron cucarachas matadas con agua hirviendo, y la mayoría de los criadores cuentan que las colonias ignoran los insectos muertos. Sirven los grillos pequeños vivos o las ninfas de cucaracha, algunos criadores quitan a los grillos las patas traseras saltadoras para que las hormigas puedan atraparlos, y si la colonia ignora una especie, prueba con otra: una colonia rechazó los grillos domésticos, pero llevó directamente al nido otra especie de grillo.