

Manica rubida

(Latreille, 1802)

Una cazadora de montaña grande y de un rojo oxidado que amontona montículos en forma de cráter alrededor de las entradas del nido, pica como una avispa y no perdona los errores en la fase de fundación.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0



De un vistazo



TEMPERATURA DEL NIDO

20–28 °C

En el nido



HUMEDAD DEL NIDO

50–70 %

En el nido



HIBERNACIÓN

5–10 °C

oct – mar



VUELOS NUPCIALES

abr – jun

Días calurosos



OBRERAS

5–9 mm

Todas del mismo tamaño



REINA

10–13 mm

Una o varias reinas



TAMAÑO DE LA COLONIA

Llega a 3000 obreras

Crecimiento: Rápido




RIESGO DE FUGA

Medio

Pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo




El año de un vistazo



Meses válidos para la Europa templada y el Mediterráneo. El tiempo decide los días exactos, así que, según dónde vivas, los vuelos pueden adelantarse o retrasarse.



Tamaños a la misma escala



Cuidados de un vistazo

ALIMENTACIÓN

Azúcar

Insectos

MEJORES NIDOS

1. Nido de Ytong
2. Montaje naturalista
3. Montaje en tubo de ensayo

POR QUÉ ESTA VALORACIÓN

- ⚠️ Obreras curiosas: pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo
- ⚠️ Semiclaustral: hay que alimentar a la reina fundadora
- ⚠️ Las obreras pueden picar



Notas de criadores

CONSEJO

Ofrece un gradiente de húmedo a bastante seco en lugar de un nido empapado. Un criador que dio a una colonia tres cámaras, de mojada a casi seca, la encontró viviendo en la más seca, aunque las colonias pequeñas también son muy sensibles a un nido que se seca.

ATENCIÓN

Las reinas fundadoras cazan por sí mismas, así que asegúrate de que tengan comida al alcance desde el primer día: una zona de forrajeo pequeña o una alimentación muy regular y, cuando aparezcan las primeras larvas, un trocito de proteína que pueda llevar al menos una vez al día. Los criadores que han sacado adelante muchas colonias dan de comer una o dos veces al día en esa fase.