

Novomessor cockerelli

(André, 1893)

Una carroñera de patas largas del desierto cuyas obreras se coordinan en equipo para arrastrar presas demasiado grandes para una sola hormiga.



Foto: Jake Nitta (froggy143), CC BY 4.0



De un vistazo



TEMPERATURA DEL NIDO

27–32 °C

En el nido



HUMEDAD DEL NIDO

50–70 %

En el nido



HIBERNACIÓN

No necesaria



VUELOS NUPCIALES

jul – ago

Tras la lluvia



OBRERAS

7–10 mm

Todas del mismo tamaño



REINA

11–14 mm

Una sola reina



TAMAÑO DE LA COLONIA

Llega a 5000 obreras

Crecimiento: Rápido




RIESGO DE FUGA

Medio

Pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo




El año de un vistazo



Meses en el área de distribución natural de la especie. El tiempo decide los días exactos, y las colonias criadas en casa pueden seguir otro ritmo.



Tamaños a la misma escala



Cuidados de un vistazo

ALIMENTACIÓN

Insectos

Azúcar

MEJORES NIDOS

1. Nido de Ytong
2. Nido de acrílico
3. Montaje naturalista

POR QUÉ ESTA VALORACIÓN

- ✓ Totalmente claustral: la reina no necesita comida hasta que llegan sus primeras obreras
- ✓ Sin hibernación que gestionar
- ⚠ Obreras curiosas: pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo
- ⚠ Necesita calor constante todo el año



Notas de criadores

CONSEJO

El calor es el factor clave. Mantén caliente una parte del nido y deja un rincón más fresco y húmedo: las colonias mantenidas a temperatura ambiente se estancan, mientras que las que están calientes crían nuevas obreras en aproximadamente un mes. Mantén la fuente de calor alejada del depósito de agua para que no se forme condensación.

ATENCIÓN

Da más proteína que semillas. Las obreras aceptan los insectos con mucha más facilidad que las semillas y no acumulan reservas de comida como sus parientes que almacenan semillas, así que los intervalos largos entre comidas son arriesgados. Algunos criadores perdieron obreras recién nacidas en colonias pequeñas sin llegar a descubrir la causa; lo que se sugería con más frecuencia eran presas más grasas y más calor. Retira las sobras en un día, porque la proteína en descomposición atrae ácaros y moho.