

Pogonomyrmex barbatus

(Smith, 1858)

Hormiga cosechadora roja

Una gran cosechadora de semillas roja de los desiertos y pastizales del suroeste, con una picadura dolorosa y colonias que viven de 20 a 30 años.



Foto: Jake Nitta (froggy143), CC BY 4.0



De un vistazo



TEMPERATURA DEL NIDO

26–32 °C

En el nido



HUMEDAD DEL NIDO

50–70 %

Graneros de semillas: 30–50 %



HIBERNACIÓN

12–16 °C

dic – feb



VUELOS NUPCIALES

jun – sept

Tras la lluvia, Días calurosos,
Tiempo en calma



OBreras

6–10 mm

Todas del mismo tamaño



REINA

11–13 mm

Una sola reina



TAMAÑO DE LA COLONIA

Llega a 10.000 obreras

Crecimiento: Moderado




RIESGO DE FUGA

Medio

Pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo




El año de un vistazo



Meses en el área de distribución natural de la especie. El tiempo decide los días exactos, y las colonias criadas en casa pueden seguir otro ritmo.



Tamaños a la misma escala



Cuidados de un vistazo

ALIMENTACIÓN

Semillas

Insectos

Azúcar

MEJORES NIDOS

1. Montaje naturalista
2. Nido de Ytong
3. Nido de acrílico

POR QUÉ ESTA VALORACIÓN

- ✓ Totalmente claustral: la reina no necesita comida hasta que llegan sus primeras obreras
- ✓ Almacena semillas, así que saltarse una comida no es un problema
- ⚠ Obreras curiosas: pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo
- ⚠ Necesita un gradiente de humedad, con graneros secos y cámaras de cría húmedas
- ⚠ Las colonias se vuelven enormes y necesitan espacio para expandirse
- ⚠ Las obreras pueden picar



Notas de criadores

CONSEJO

El calor es lo que las hace crecer. Mantén el extremo cálido del nido a unos 30 °C con un cable calefactor o una manta térmica y deja el resto más fresco. Los vendedores informan de que la cría se desarrolla mucho más despacio por debajo de unos 24 °C y de que las colonias apenas crecen a temperatura ambiente normal.

ATENCIÓN

El agua con miel sola no basta. Un criador alimentó a ocho colonias jóvenes solo con agua con miel, vio cómo se reducía la cría y le aconsejaron poner semillas trituradas y dar insectos dos o tres veces por semana. Ofrece semillas pequeñas, como poa de los prados, diente de león o chí, y retira las que broten o se enmohezcan.