

Acromyrmex octospinosus

(Reich, 1793)

Fourmi manioc

Une coupeuse de feuilles épineuse, à la peau rugueuse, qui cultive son champignon sur du rosier et de la ronce et coupe les fleurs et les fruits aussi volontiers que les feuilles.



Photo : Elias Freyhof (eliasfrehof36614), CC BY 4.0

En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID
23-27 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID
80-95 %

Dans le nid



HIBERNATION
Pas nécessaire



VOLS NUPTIAUX
mai – juil.

Après la pluie



OUVRIÈRES
2-9 mm

majors jusqu'à 12 mm



REINE
12-14 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE
Atteint 20 000 ouvrières

Croissance : Rapide



RISQUE D'ÉVASION
Élevé


Des championnes de l'évasion : utilisez une aire de chasse fermée et une bonne barrière

L'année en un coup d'œil



Mois dans l'aire de répartition naturelle de l'espèce. La météo décide des jours exacts, et les colonies élevées à l'intérieur peuvent suivre un autre rythme.

Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Feuilles fraîches

Sucre

MEILLEURS NIDS

- Nid en acrylique
- Installation naturaliste

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Aucune hibernation à gérer
- ⚠ Une vraie championne de l'évasion, qui demande une installation anti-évasion
- ⚠ Semi-claustrale : la reine fondatrice doit être nourrie
- ⚠ A besoin d'un jardin de champignons nourri chaque jour avec des feuilles fraîches
- ⚠ Les colonies deviennent énormes et ont besoin de place pour s'étendre

Notes d'éleveurs

ASTUCE

Gardez le champignon sous une petite cloche et laissez la colonie régler elle-même son humidité. Quand l'air devient trop sec, les ouvrières peuvent déplacer le jardin vers l'endroit le plus humide qu'elles trouvent : après qu'un hygromètre d'éleveur est tombé en panne sans prévenir, elles ont déménagé la plus grande partie du champignon sous des feuilles de rosier humides, dans la zone d'alimentation. Comparez l'hygromètre avec un deuxième, et réchauffez l'air autour de l'installation plutôt que le jardin lui-même.

ATTENTION

Une seule fleur traitée peut ruiner une petite colonie. Après une rose cueillie lors d'un voyage, des ouvrières sont restées immobiles ou se sont noyées dans l'eau sucrée, près de la moitié de la colonie est morte et le champignon a diminué. N'utilisez que des plantes dont vous êtes sûr qu'elles n'ont pas été traitées.