

Aphaenogaster senilis

Mayr, 1853

Fourmi gitane

Une chasseuse agitée aux longues pattes, qui se propage en divisant sa colonie plutôt qu'en volant, et rapporte la nourriture liquide au nid sur de petits débris.



Photo : Diego González Dopico, CC BY 4.0

En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID
21–27 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID
50–65 %

Dans le nid



HIBERNATION
12–16 °C

déc. – févr.



VOLS NUPTIAUX
Aucun vol

Fission de colonie



OUVRIÈRES
5–7 mm

Toutes de la même taille



REINE
8–10 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE
Atteint 3 000 ouvrières

Croissance : Rapide



RISQUE D'ÉVASION
Moyen

Prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse

L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide du moment exact : il peut donc arriver plus tôt ou plus tard chez vous.

Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Insectes

Sucre

MEILLEURS NIDS

- Nid en Ytong
- Installation naturaliste
- Nid en acrylique

POURQUOI CETTE NOTE

- ⚠ Des ouvrières curieuses : prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse
- ⚠ Les ouvrières peuvent piquer

Notes d'éleveurs

ASTUCE

Proposez la nourriture liquide avec quelques grains de sable ou de minuscules morceaux d'éponge à côté. Les ouvrières ne peuvent pas se passer le liquide de bouche à bouche : elles imbibent donc ces éléments et les portent à la reine et au couvain, et un éleveur a vu, à la place, de simples coupelles enterrées sous la mousse et le substrat.

ATTENTION

Il n'y a pas de vol nuptial et les reines ne fondent pas de colonie seules : l'espèce est donc vendue sous forme de fragment de colonie avec une reine, des ouvrières et du couvain. Lors d'un déménagement, videz le tube dans l'aire de chasse au lieu de le relier au nouveau nid, car les ouvrières peuvent s'attaquer entre elles pendant le déménagement.