

Aphaenogaster subterranea

(Latreille, 1798)

Une fourmi de forêt fine et discrète, qui niche sous les pierres, chasse sans bruit dans la litière de feuilles et rapporte les liquides sucrés au nid sur des grains de terre imbibés.



Photo : Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID
20–26 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID
50–65 %

Dans le nid



HIBERNATION
8–12 °C
nov. – févr.



VOLS NUPTIAUX
juil. – sept.



OUVRIÈRES
3–5 mm

Toutes de la même taille



REINE
7–8 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE
Atteint 2000 ouvrières

Croissance : Modérée



RISQUE D'ÉVASION
Faible


Des fourmis calmes qui tentent rarement de s'échapper

L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.

Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Insectes

Sucre

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Installation naturaliste
3. Nid sandwich

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Des ouvrières calmes qui tentent rarement de s'échapper
- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ⚠ Les ouvrières peuvent piquer

Notes d'éleveurs

ASTUCE

Soyez patient avec une jeune colonie : elle démarre lentement, et les éleveurs signalent seulement une poignée d'ouvrières après les premiers mois, puis une croissance plus rapide une fois la colonie bien installée.

ATTENTION

Ne laissez pas tout le nid se dessécher ni passer d'un extrême à l'autre. C'est une espèce de forêts humides et ombragées, et la base de données allemande sur les fourmis note que la colonie se développe plus lentement quand elle est gardée trop au sec : gardez donc une zone humide pour le couvain.