

# Atta cephalotes

(Linnaeus, 1758)

## Fourmi parasol

La coupeuse de feuilles classique : des ouvrières brillantes, rouge orangé et de toutes tailles, rapportent des morceaux de feuilles découpés pour nourrir un jardin de champignons vivant.



Photo : a6475, CC BY-SA 4.0



### En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

**23-27 °C**

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

**85-95 %**

Dans le nid



HIBERNATION

**Pas nécessaire**



VOLS NUPTIAUX

**avr. – juil.**

Après la pluie



OUVRIÈRES

**2-12 mm**

majors jusqu'à 18 mm



REINE

**22-30 mm**

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE

**Pas encore de données**

Croissance : Très rapide



RISQUE D'ÉVASION

**Élevé**


Des championnes de l'évasion : utilisez une aire de chasse fermée et une bonne barrière



### L'année en un coup d'œil



### Tailles à la même échelle



### Les soins en un coup d'œil

#### ALIMENTATION

Feuilles fraîches

Sucre

#### MEILLEURS NIDS

1. Nid en acrylique
2. Installation naturaliste

#### POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ✓ Aucune hibernation à gérer
- ⚠ Une vraie championne de l'évasion, qui demande une installation anti-évasion
- ⚠ A besoin d'un jardin de champignons nourri chaque jour avec des feuilles fraîches
- ⚠ Croît très vite et a besoin de beaucoup de protéines et de place



### Notes d'éleveurs

#### ASTUCE

Faites circuler l'air autour du champignon, et ne vous contentez pas de trous dans le couvercle. Le jardin dégage du CO2, qui descend, et dans le bac d'un éleveur doté d'une seule aération en haut, le champignon a été démantelé jusqu'à ce que l'on ajoute de la ventilation ; les éleveurs expérimentés conseillent des aérations en haut et en bas. Une petite cloche au-dessus du jardin permet aux fourmis de créer leur propre microclimat humide ; ne laissez pas d'eau liquide toucher le champignon et allez-y doucement avec les aliments riches en eau comme la laitue.

#### ATTENTION

La chaleur est un danger plus grand qu'une pièce fraîche, et le thermomètre de la pièce est trompeur. Un éleveur a vu le jardin diminuer semaine après semaine et le couvain disparaître après une vague de chaleur dans la pièce, et la reine de cette colonie élevée de longue date a été retrouvée morte par la suite ; d'autres éleveurs signalent que le jardin diminue dès qu'il fait trop chaud. Placez un thermomètre à sonde dans la chambre du champignon, évitez que les sources de chaleur touchent le jardin et prévoyez un refroidissement estival.