

Camponotus cruentatus

(Latreille, 1802)

Fourmi ensanglantée

Une géante méditerranéenne d'un noir mat, avec une bande rouge rouille sur le gaster, timide tant que la colonie est petite et féroce territoriale dès qu'elle grandit.



Photo : Jonghyun Park, CC BY 4.0

En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID
25–30 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID
40–60 %

Dans le nid



HIBERNATION
10–15 °C

nov. – févr.



VOLS NUPTIAUX
juin – juil.

Journées chaudes, Temps calme



OUVRIÈRES
6–10 mm

majors jusqu'à 15 mm



REINE
15–18 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE
Atteint 3 000 ouvrières

Croissance : Rapide



RISQUE D'ÉVASION
Moyen


Prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse

L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.

Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Nid en acrylique
3. Installation naturaliste

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ⚠ Des ouvrières curieuses : prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse

Notes d'éleveurs

ASTUCE

Proposez un bout chaud et un bout plus frais, par exemple avec un tapis chauffant le long d'un côté du nid. La colonie déplace son couvain vers la chaleur, et plusieurs éleveurs ont vu le développement stagner dans un nid resté frais.

ATTENTION

Gardez l'aire de chasse sèche et donnez au nid une chambre humide. Des éleveurs ont perdu des ouvrières et vu de la moisissure se développer dans des nids arrosés trop souvent ; pourtant, un éleveur a attribué à un nid presque sec le fait que sa reine pondait très peu d'œufs, et le réhumidifier a aidé.