

# Camponotus fedtschenkoi

Mayr, 1877

Une fourmi charpentière d'un doré pâle, originaire des steppes sèches d'Asie centrale, qui creuse son nid dans le sol et sort la nuit.



Photo : Harrison J Elkins (elkins456), CC BY 4.0

## En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

**24–28 °C**

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

**50–70 %**

Dans le nid



HIBERNATION

**15–18 °C**

déc. – févr.



VOLS NUPTIAUX

**avr. – mai**



OUVRIÈRES

**4–9 mm**

majors jusqu'à 12 mm



REINE

**12–14 mm**

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE

**Atteint 2000 ouvrières**

Croissance : Modérée




RISQUE D'ÉVASION

**Moyen**


Prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse

## L'année en un coup d'œil



Mois dans l'aire de répartition naturelle de l'espèce. La météo décide des jours exacts, et les colonies élevées à l'intérieur peuvent suivre un autre rythme.

## Tailles à la même échelle



## Les soins en un coup d'œil

### ALIMENTATION

Sucre

Insectes

### MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Nid en acrylique
3. Installation naturaliste

### POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ⚠ Des ouvrières curieuses : prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse

## Notes d'éleveurs

### ASTUCE

Donnez au nid un coin humide et laissez le reste sec. Ce sont des fourmis de sols secs, et après qu'un éleveur a trop arrosé le nid, les ouvrières ont paniqué et se sont mises à déplacer du sable dans tous les sens.

### ATTENTION

Ne chauffez jamais tout le nid. Dans le journal d'un éleveur, un tapis chauffant placé sous une jeune colonie a été suivi d'une forte mortalité, que l'éleveur a attribuée à une surchauffe ou à un changement brutal; ne réchauffez donc qu'un côté et laissez les fourmis choisir leur emplacement.