

Camponotus herculeanus

(Linnaeus, 1758)

Fourmi hercule

Une géante noire résistante au froid des forêts de conifères du Nord, qui creuse son nid dans de vieilles souches et des arbres sur pied.



Photo : Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

18–25 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

50–60 %

Dans le nid



HIBERNATION

5–8 °C

oct. – mars



VOLS NUPTIAUX

mai – juin

Journées chaudes, Air humide



OUVRIÈRES

6–11 mm

majors jusqu'à 13 mm



REINE

14–17 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 5 000

ouvrières

Croissance : Modérée




RISQUE D'ÉVASION

Moyen


Prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse

L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.

Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Nid en bois
3. Installation naturaliste

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ⚠ Des ouvrières curieuses : prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse
- ⚠ Demande une hibernation au froid, par exemple dans un frigo

Notes d'éleveurs

ASTUCE

Gardez le nid plutôt frais et n'ajoutez qu'un petit point chaud, par exemple un câble chauffant sous une extrémité. La colonie déplace d'elle-même son couvain vers la chaleur, et une chaleur constante n'est pas nécessaire pour cette espèce nordique.

ATTENTION

Les nids en bois se dessèchent facilement. Un éleveur a perdu toute une saison quand des colonies dans des nids en bois secs ont stagné et mangé leur couvain : donnez donc à chaque nid en bois une chambre humide ou une réserve d'eau.