

Camponotus lateralis

(Olivier, 1792)

Fourmi latérale

Une petite fourmi charpentière timide, à tête rouge et au gaster noir, qui se fait passer pour une fourmi acrobate et suit les pistes de celle-ci pour trouver de la nourriture.



Photo : Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID
21–27 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID
40–60 %

Dans le nid



HIBERNATION
8–12 °C

nov. – févr.



VOLS NUPTIAUX
avr. – mai

Journées chaudes, Temps calme



OUVRIÈRES
3–7 mm

Tailles variées



REINE
8–10 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE
Atteint 1000 ouvrières

Croissance : Modérée



RISQUE D'ÉVASION
Moyen


Prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse

L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.

Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Nid en bois
2. Nid en Ytong
3. Nid en acrylique

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ⚠ Des ouvrières curieuses : prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse

Notes d'éleveurs

ASTUCE

Donnez à la colonie un nid compact, sec et chaud, et une source d'eau séparée. Elle vient de forêts méditerranéennes sèches et ensoleillées et n'aime pas l'humidité ; la colonie d'un éleveur gardait son couvain dans un coin, à l'écart de la partie humide du nid.

ATTENTION

Soyez patient avec les reines fondatrices. C'est une espèce à démarrage lent, qui peut mettre longtemps à pondre, et la première génération d'ouvrières est peu nombreuse. Les éleveurs conseillent de laisser une jeune colonie dans son tube à essai, avec sa réserve d'eau, pendant les premiers hivers au lieu de la presser de passer dans un nid.