

Camponotus ligniperda

(Latreille, 1802)

Fourmi rouge-bois

L'une des plus grosses fourmis d'Europe, une géante brillante rouge et noire qui vit au rythme lent de sa propre horloge saisonnière.




Photo : Donald Davesne, CC BY 4.0



En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID
20–25 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID
50–60 %

Dans le nid



HIBERNATION
5–8 °C

oct. – mars



VOLS NUPTIAUX
mai – juin

Journées chaudes, Air humide



OUVRIÈRES
6–10 mm

majors jusqu'à 14 mm



REINE
16–18 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE
Atteint 5 000 ouvrières

Croissance : Modérée




RISQUE D'ÉVASION
Moyen

Prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse




L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.



Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Nid en bois
3. Installation naturaliste

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ⚠ Des ouvrières curieuses : prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse
- ⚠ Demande une hibernation au froid, par exemple dans un frigo



Notes d'éleveurs

ASTUCE

Offrez une chambre humide à côté d'une partie plus sèche du nid. Les fourmis portent les œufs et les larves vers les endroits les plus humides, et un nid gardé entièrement sec ralentit le couvain.

ATTENTION

Ne gardez pas la colonie au chaud toute l'année. Elle suit une horloge interne annuelle, et un chauffage constant peut lui faire terminer sa saison trop tôt et entrer en repos hivernal dès la fin de l'été. Un petit coin chaud pour le couvain suffit.