

Camponotus sylvaticus

(Olivier, 1792)

Fourmi sylvatique

Une fourmi charpentière méditerranéenne rouge et noire, aux longues pattes, qui file hors de portée après la tombée de la nuit et demande quelques années de patience pour devenir une grande colonie.



Photo : Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

22–28 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

40–60 %

Dans le nid



HIBERNATION

8–14 °C

nov. – févr.



VOLS NUPTIAUX

juin – août

Journées chaudes, Air humide



OUVRIÈRES

6–12 mm

majors jusqu'à 15 mm



REINE

14–17 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 5 000

ouvrières

Croissance : Modérée




RISQUE D'ÉVASION

Élevé


Des championnes de l'évasion : utilisez une aire de chasse fermée et une bonne barrière

L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.

Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Nid en acrylique
3. Installation naturaliste

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ⚠ Une vraie championne de l'évasion, qui demande une installation anti-évasion

Notes d'éleveurs

ASTUCE

Attendez-vous à un démarrage très lent. Une colonie suivie sur le long terme n'avait qu'une quinzaine de nourrices après sa première année, une cinquantaine d'ouvrières au début de la deuxième et des centaines à la fin de celle-ci, et elle a ensuite eu besoin chaque saison d'un nid plus grand et de beaucoup plus de nourriture.

ATTENTION

Les ouvrières ont de longues pattes et sont extrêmement rapides. Un éleveur les a vues filer sur un revêtement anti-évasion et en a perdu beaucoup chaque fois qu'on ouvrait le couvercle : nourrissez donc par une petite trappe ou depuis une aire de chasse reliée et doublez la barrière d'une seconde.