

Carebara diversa

(Jerdon, 1851)

Une maraudeuse en raid, dont les colonnes de minuscules ouvrières et de majors à tête géante ressemblent à celles des fourmis légionnaires, les plus petites ouvrières voyageant sur le dos des plus grandes.



Photo : Jonghyun Park (clurarit), CC BY 4.0

En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

26–30 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

60–80 %

Dans le nid



HIBERNATION

Pas nécessaire



VOLS NUPTIAUX

Pas encore de données

Après la pluie



OUVRIÈRES

2–9 mm

majors jusqu'à 15 mm



REINE

19–25 mm

Une ou plusieurs reines



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 10 000 ouvrières

Croissance : Rapide



RISQUE D'ÉVASION

Élevé


Des championnes de l'évasion : utilisez une aire de chasse fermée et une bonne barrière

L'année en un coup d'œil



Mois dans l'aire de répartition naturelle de l'espèce. La météo décide des jours exacts, et les colonies élevées à l'intérieur peuvent suivre un autre rythme.

Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Insectes

Sucre

MEILLEURS NIDS

1. Installation naturaliste
2. Nid en Ytong

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ✓ Aucune hibernation à gérer
- ⚠ Une vraie championne de l'évasion, qui demande une installation anti-évasion
- ⚠ A besoin d'une chaleur constante toute l'année
- ⚠ Les colonies deviennent énormes et ont besoin de place pour s'étendre

Notes d'éleveurs

ASTUCE

Offrez-leur un nid profond en terre, ou un mélange de terre et d'Ytong, qui reste humide mais bien ventilé, et laissez les fourmis le creuser et le façonner elles-mêmes. Gardez toujours au moins une chambre mouillée, car une colonie desséchée peut mourir en une journée, et faites d'abord bouillir la terre du jardin pour éviter acariens et moisissures.

ATTENTION

Ne démarrez pas petit. Les éleveurs signalent que les reines isolées sont très difficiles à élever et que des colonies de quelques centaines d'ouvrières seulement prospèrent souvent les premiers mois puis déclinent au bout de presque un an, les minors, de courte vie, n'étant plus remplacées : une colonie établie avec beaucoup de couvain est donc un départ plus sûr.