

Formica cinerea

Mayr, 1853

Grande, rapide et nerveuse : une projeteuse d'acide formique qui peut atteindre 10 000 ouvrières.



En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

21–27 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

50–60 %

Dans le nid



HIBERNATION

5–8 °C

oct. – mars



VOLS NUPTIAUX

juin – août



OUVRIÈRES

4–8 mm

Toutes de la même taille



REINE

8–11 mm

Une ou plusieurs reines



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 10 000 ouvrières

Croissance : Très rapide



RISQUE D'ÉVASION

Élevé

Des championnes de l'évasion : utilisez une aire de chasse fermée et une bonne barrière




L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.



Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Nid sandwich
3. Nid en acrylique

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ⚠ Une vraie championne de l'évasion, qui demande une installation anti-évasion
- ⚠ Demande une hibernation au froid, par exemple dans un frigo
- ⚠ Croît très vite et a besoin de beaucoup de protéines et de place
- ⚠ Les colonies deviennent énormes et ont besoin de place pour s'étendre



Dans mes colonies

ASTUCE

Un nid en Ytong blanc convient bien à cette espèce, car les ouvrières presque noires s'y détachent et chaque chambre est facile à observer.

ATTENTION

Les évasions sont les plus probables pendant l'entretien de l'aire de chasse, car les ouvrières se déplacent vite et de façon irrégulière : travaillez calmement et gardez un œil sur chaque fourmi jusqu'à ce que l'installation soit refermée.