

Formica fusca

Linnaeus, 1758

Fourmi toute brune

Une fourmi noire timide et vive, qui pardonne les erreurs de débutant et sert d'hôte classique aux fourmis esclavagistes.



Photo : Jonghyun Park, CC BY 4.0

En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

21-25 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

50-60 %

Dans le nid



HIBERNATION

5-8 °C

oct. – mars



VOLS NUPTIAUX

juin – août

Journées chaudes



OUVRIÈRES

4-7 mm

Toutes de la même taille



REINE

8-10 mm

Une ou plusieurs reines



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 2000 ouvrières

Croissance : Modérée



RISQUE D'ÉVASION

Moyen


Prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse

L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.

Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Installation naturaliste
3. Nid sandwich

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ⚠ Des ouvrières curieuses : prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse
- ⚠ Demande une hibernation au froid, par exemple dans un frigo

Notes d'éleveurs

ASTUCE

Prévoyez dans le nid une chambre humide et gardez l'aire de chasse sèche. L'espèce vient de terrains secs et ouverts, et les éleveurs rapportent qu'un nid humide associé à une aire de chasse sèche fonctionne bien.

ATTENTION

Laissez la reine fondatrice tranquille autant que possible. Des éleveurs rapportent des reines qui ont mangé presque toutes leurs larves après des contrôles et des vibrations répétés : gardez donc le tube sombre, immobile et fermé jusqu'à l'apparition des premières ouvrières.