

Formica sanguinea

Latreille, 1798

Fourmi rouge-sang

Une pillarde audacieuse, rouge et noire, qui vole les nymphes d'autres Formica pour les élever comme auxiliaires : un projet pour les éleveurs qui maîtrisent déjà les bases.



Photo : Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

21–26 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

50–60 %

Dans le nid



HIBERNATION

5–8 °C

oct. – mars



VOLS NUPTIAUX

juin – août



OUVRIÈRES

6–9 mm

Toutes de la même taille



REINE

9–11 mm

Une ou plusieurs reines



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 5000

ouvrières

Croissance : Rapide



RISQUE D'ÉVASION

Élevé

Des championnes de l'évasion : utilisez une aire de chasse fermée et une bonne barrière




L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.



Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Installation naturaliste
3. Nid sandwich

POURQUOI CETTE NOTE

- ⚠ Une vraie championne de l'évasion, qui demande une installation anti-évasion
- ⚠ Parasite social : la reine a besoin d'ouvrières hôtes pour démarrer
- ⚠ Demande une hibernation au froid, par exemple dans un frigo



Notes d'éleveurs

ASTUCE

Prenez Formica fusca comme hôte : elle partage l'habitat ouvert et sec de cette espèce, et c'est celle que proposent les boutiques et qu'utilisent la plupart des éleveurs. Formica cunicularia convient aussi, mais les Camponotus, les fourmis rousses des bois et toutes les Myrmicinae ne sont pas des hôtes adaptés.

ATTENTION

Une razzia peut anéantir une petite colonie hôte en une seule nuit, et l'acide formique peut s'accumuler dans les contenants fermés et tuer les auxiliaires. Ne reliez une colonie hôte que si vous pouvez la sacrifier, utilisez une aire de chasse spacieuse et ventilée où vous pouvez couper la liaison à tout moment, et restez à proximité pendant l'opération.