

Harpegnathos venator

(Smith, 1858)

Une chasseuse à la vue perçante et aux mandibules en faucille, qui se fige, agite son gaster puis bondit sur sa proie vivante.



Photo : portoid, CC BY 4.0



En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

24–28 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

60–80 %

Dans le nid



HIBERNATION

Pas nécessaire



VOLS NUPTIAUX

Pas encore de données

Après la pluie



OUVRIÈRES

14–18 mm

Toutes de la même taille



REINE

16–20 mm

Une ou plusieurs reines



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 400 ouvrières

Croissance : Modérée



RISQUE D'ÉVASION

Moyen

Prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse




L'année en un coup d'œil



Mois dans l'aire de répartition naturelle de l'espèce. La météo décide des jours exacts, et les colonies élevées à l'intérieur peuvent suivre un autre rythme.



Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Installation naturaliste
3. Installation en tube à essai

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Aucune hibernation à gérer
- ⚠ Des ouvrières curieuses : prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse
- ⚠ Semi-claustrale : la reine fondatrice doit être nourrie
- ⚠ A besoin d'une chaleur constante toute l'année
- ⚠ Les ouvrières peuvent piquer



Notes d'éleveurs

ASTUCE

Offrez au nid une chaleur constante et des chambres humides, et gardez l'aire de chasse plus sèche. Les éleveurs qui comptaient sur une température ambiante fraîche rapportent un couvain lent à se développer et des nymphes ouvertes et mangées avant l'éclosion, alors que la plupart des témoignages récents de colonies en bonne santé font état d'un nid chauffé ou d'une pièce chaude.

ATTENTION

Ne proposez que des proies vivantes. Lors d'un test sur le terrain, les ouvrières n'ont pas attaqué des blattes tuées à l'eau bouillante, et la plupart des éleveurs rapportent que les colonies ignorent les insectes morts. De petits grillons vivants ou des nymphes de blattes conviennent, certains éleveurs retirent les pattes arrière sauteuses des grillons pour que les fourmis puissent les attraper, et si la colonie ignore une espèce, essayez-en une autre : une colonie a refusé des grillons domestiques mais a porté directement dans le nid une autre espèce de grillon.