

DÉBUTANT · 2/7

COMPILÉE À PARTIR DE SOURCES

Lasius alienus

(Foerster, 1850)

Un petit Lasius brun et timide des prairies chaudes et sèches et des sols calcaires, facile à confondre avec la fourmi noire des jardins.



Photo : Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0



En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID
21–25 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID
50–60 %

Dans le nid



HIBERNATION
5–8 °C

oct. – mars



VOLS NUPTIAUX
juil. – sept.



OUVRIÈRES
2–4 mm

Toutes de la même taille



REINE
7–9 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE
Atteint 5000 ouvrières

Croissance : Modérée




RISQUE D'ÉVASION
Moyen

Prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse




L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.



Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Nid sandwich
2. Nid en Ytong
3. Nid en acrylique

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ⚠ Des ouvrières curieuses : prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse
- ⚠ Demande une hibernation au froid, par exemple dans un frigo



Notes d'éleveurs

ASTUCE

Les soins ressemblent beaucoup à ceux de Lasius niger : la reine claustrale n'a besoin d'aucune nourriture jusqu'à la naissance de ses premières ouvrières ; ensuite, proposez de l'eau sucrée ou du miel et de petits insectes comme des mouches des fruits. Dans un compte rendu d'élevage allemand, les ouvrières rapportaient volontiers de petites proies au nid, mais ne visitaient le miel que de temps en temps après les premières semaines.

ATTENTION

Vérifiez l'identification avant de vous organiser en conséquence. Les reines fondatrices se confondent facilement avec Lasius niger, et des membres expérimentés de forums disent qu'on ne peut pas identifier cette fourmi d'après des photos. Attendez des ouvrières de taille normale et observez-en plusieurs sous une forte loupe, car les toutes petites premières ouvrières portent moins de poils. D'ici là, appelez la colonie Lasius cf. alienus.

Toutes les valeurs sont des points de départ : observez votre colonie et ajustez-les. Fiche complète avec sources et FAQ :

brumaants.com/fr/species/lasius-alienus

