

Lasius flavus

(Fabricius, 1782)

Fourmi jaune des prairies

Une habitante timide et dorée du sol, qui élève des pucerons des racines et bâtit des monticules herbeux dans les vieilles prairies.



Photo : Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

20–25 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

60–70 %

Dans le nid



HIBERNATION

5–8 °C

oct. – mars



VOLS NUPTIAUX

juil. – sept.

Journées chaudes, Temps calme



OUVRIÈRES

2–5 mm

Toutes de la même taille



REINE

7–9 mm

Une ou plusieurs reines



TAILLE DE LA COLONIE

Pas encore de données

Croissance : Modérée




RISQUE D'ÉVASION

Faible


Des fourmis calmes qui tentent rarement de s'échapper

L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.

Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Nid sandwich
3. Installation naturaliste

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Des ouvrières calmes qui tentent rarement de s'échapper
- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ⚠ Demande une hibernation au froid, par exemple dans un frigo

Notes d'éleveurs

ASTUCE

Dans la nature, elles vivent surtout du miellat des pucerons des racines : proposez donc du miel ou de l'eau sucrée dès que la colonie est active, et ajoutez de petits insectes mous, comme des mouches des fruits, pour le couvain.

ATTENTION

Les colonies grandissent lentement par rapport aux autres Lasius : attendez-vous à une petite colonie pendant les premières années et laissez la reine fondatrice tranquille dans son tube à essai.