

Manica rubida

(Latreille, 1802)

Une grande chasseuse de montagne rouge rouille, qui amoncelle des monticules en forme de cratère autour des entrées de son nid, pique comme une guêpe et ne pardonne pas les erreurs pendant la phase de fondation.



Photo : Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0



En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

20–28 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

50–70 %

Dans le nid



HIBERNATION

5–10 °C

oct. – mars



VOLS NUPTIAUX

avr. – juin

Journées chaudes



OUVRIÈRES

5–9 mm

Toutes de la même taille



REINE

10–13 mm

Une ou plusieurs reines



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 3 000 ouvrières

Croissance : Rapide




RISQUE D'ÉVASION

Moyen

Prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse




L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.



Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

- Nid en Ytong
- Installation naturaliste
- Installation en tube à essai

POURQUOI CETTE NOTE

- ⚠ Des ouvrières curieuses : prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse
- ⚠ Semi-claustre : la reine fondatrice doit être nourrie
- ⚠ Les ouvrières peuvent piquer



Notes d'éleveurs

ASTUCE

Proposez un gradient d'humidité, de l'humide au plutôt sec, plutôt qu'un nid détrempé. Un éleveur qui avait donné à une colonie trois chambres, de la plus humide à la presque sèche, l'a trouvée installée dans la plus sèche, mais les petites colonies sont aussi très sensibles à un nid qui se dessèche.

ATTENTION

Les reines fondatrices chassent elles-mêmes : assurez-vous qu'elles aient accès à de la nourriture dès le premier jour, avec une petite aire de chasse ou un nourrissage très régulier, et, dès l'apparition des premières larves, un petit morceau de protéine qu'elles peuvent porter au moins une fois par jour. Les éleveurs qui ont élevé de nombreuses colonies nourrissent une à deux fois par jour à ce stade.