

Messor capitatus

(Latreille, 1798)

Une moissonneuse d'un noir luisant, aux majors à grosse tête qui broient les graines dures en pain de fourmi sur les sols secs et rocailloux.



Photo : Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

22–28 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

50–60 %

Greniers : 30–50 %



HIBERNATION

10–15 °C

déc. – févr.



VOLS NUPTIAUX

sept. – nov.

Après la pluie



OUVRIÈRES

4–8 mm

majors jusqu'à 13 mm



REINE

13–15 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 5 000 ouvrières

Croissance : Rapide




RISQUE D'ÉVASION

Faible


Des fourmis calmes qui tentent rarement de s'échapper

L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.

Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Graines

Insectes

Sucre

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Nid en acrylique
3. Installation naturaliste

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Des ouvrières calmes qui tentent rarement de s'échapper
- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ✓ Fait des réserves de graines : un nourrissage manqué n'est pas un problème
- ⚠ Demande un gradient d'humidité, avec des greniers secs et des chambres de couvain humides

Notes d'éleveurs

ASTUCE

Donnez aux premières ouvrières de petites graines, comme celles de pissenlit ou de graminées, que même les plus petites peuvent écraser seules. La reine elle-même peut aider à casser les graines plus dures que les premières ouvrières ne savent pas encore ouvrir.

ATTENTION

Ce sont de fortes creuseuses qui percent des tunnels dans l'Ytong et le plâtre ramolli, surtout là où c'est humide. Laissez une paroi épaisse entre les chambres et la vitre.