

Messor ebeninus

Santschi, 1927

Une moissonneuse d'un noir d'ébène luisant du Moyen-Orient, qui stocke ses graines à l'étage et élève son couvain dans la terre humide, bien plus bas.



Photo : Moshe Neeman (משה נאמן, moshe_neeman), CC BY 4.0



En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

22–28 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

50–60 %

Greniers : 30–50 %



HIBERNATION

15–18 °C

janv. – févr.



VOLS NUPTIAUX

nov. – déc.

Après la pluie



OUVRIÈRES

4–8 mm

majors jusqu'à 10 mm



REINE

11–12 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 5 000 ouvrières

Croissance : Modérée




RISQUE D'ÉVASION

Faible

Des fourmis calmes qui tentent rarement de s'échapper




L'année en un coup d'œil



Mois dans l'aire de répartition naturelle de l'espèce. La météo décide des jours exacts, et les colonies élevées à l'intérieur peuvent suivre un autre rythme.



Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Graines

Insectes

Sucre

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Nid en acrylique
3. Installation naturaliste

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Des ouvrières calmes qui tentent rarement de s'échapper
- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ✓ Fait des réserves de graines : un nourrissage manqué n'est pas un problème
- ⚠ Demande un gradient d'humidité, avec des greniers secs et des chambres de couvain humides



Notes d'éleveurs

ASTUCE

Reproduisez les deux étages du nid sauvage : une partie haute sèche pour la réserve de graines et une partie basse humide pour la reine et le couvain. Dans un nid en Ytong ou en plâtre, n'humidifiez qu'une extrémité et laissez l'autre sèche.

ATTENTION

Une reine capturée après le vol nuptial d'automne ne pond qu'à la fin de l'hiver : un tube sans œufs pendant des mois est donc normal. La jeune colonie grandit ensuite lentement : dans cette étude, elle ne comptait que quelques dizaines d'ouvrières à l'automne suivant.