

Messor structor

(Latreille, 1798)

Une moissonneuse brune à la surface rugueuse, qui partage son nid avec de nombreuses reines et se propage en détachant de nouvelles colonies.



Photo : Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0



En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

22–28 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

50–70 %

Greniers : 30–50 %



HIBERNATION

8–12 °C

nov. – févr.



VOLS NUPTIAUX

avr. – juin



OUVRIÈRES

4–8 mm

majors jusqu'à 10 mm



REINE

9–11 mm

Plusieurs reines



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 5 000 ouvrières

Croissance : Rapide




RISQUE D'ÉVASION

Faible

Des fourmis calmes qui tentent rarement de s'échapper




L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.



Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Graines

Insectes

Sucre

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Nid en acrylique
3. Installation naturaliste

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Des ouvrières calmes qui tentent rarement de s'échapper
- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ✓ Fait des réserves de graines : un nourrissage manqué n'est pas un problème
- ⚠ Demande un gradient d'humidité, avec des greniers secs et des chambres de couvain humides



Notes d'éleveurs

ASTUCE

Démarrez avec une reine accompagnée d'ouvrières, ou réunissez plusieurs reines. Les éleveurs français rapportent que les reines isolées échouent souvent à fonder une colonie en captivité, car l'espèce semble démarrer ses nouveaux nids surtout par bourgeonnement.

ATTENTION

Les ouvrières creusent le béton cellulaire et le plâtre, surtout quand elles manquent de place. Revêtez un nid en Ytong de mortier, de colle à carrelage ou d'enduit à base de résine, ou utilisez de l'acrylique, et ne laissez jamais de parois fines.