

Messor wasmanni

Krausse, 1910

Une moissonneuse à grosse tête des prairies ensoleillées d'Italie et des Balkans, aux pistes bien ordonnées vers son nid et dont le nom s'écrit encore avec un prudent cf.



Photo : Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0



En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

22–26 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

50–70 %

Greniers : 30–50 %



HIBERNATION

12–15 °C

déc. – févr.



VOLS NUPTIAUX

sept. – nov.

Après la pluie



OUVRIÈRES

4–8 mm

majors jusqu'à 10 mm



REINE

12–14 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 5 000 ouvrières

Croissance : Modérée




RISQUE D'ÉVASION

Faible

Des fourmis calmes qui tentent rarement de s'échapper




L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.



Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Graines

Insectes

Sucre

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Nid en acrylique
3. Installation naturaliste

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Des ouvrières calmes qui tentent rarement de s'échapper
- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ✓ Fait des réserves de graines : un nourrissage manqué n'est pas un problème
- ⚠ Demande un gradient d'humidité, avec des greniers secs et des chambres de couvain humides



Notes d'éleveurs

ASTUCE

Proposez de temps en temps des épis de graminées entiers, et pas seulement des graines en vrac : dans la nature, ces fourmis cueillent les graines directement sur la plante autant qu'au sol.

ATTENTION

Une reine capturée après le vol nuptial d'automne ne commence généralement à pondre qu'au printemps, après le repos hivernal : un tube à essai qui paraît vide tout l'hiver est donc normal. Gardez-le sombre et calme au lieu d'aller contrôler la reine.