

Myrmica rubra

(Linnaeus, 1758)

Fourmi rouge

Une fourmi rouge combative des prairies humides, qui vit en vastes colonies à plusieurs reines et défend son nid d'une piqure comparable à celle d'une ortie.



Photo : Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0



En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

18–25 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

50–70 %

Dans le nid



HIBERNATION

5–8 °C

oct. – mars



VOLS NUPTIAUX

août – sept.

Temps calme



OUVRIÈRES

4–6 mm

Toutes de la même taille



REINE

5–7 mm

Plusieurs reines



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 10 000

ouvrières

Croissance : Rapide




RISQUE D'ÉVASION

Moyen

Prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse




L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.



Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Installation naturaliste
3. Nid sandwich

POURQUOI CETTE NOTE

- ⚠ Des ouvrières curieuses : prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse
- ⚠ Semi-claustrale : la reine fondatrice doit être nourrie
- ⚠ Demande une hibernation au froid, par exemple dans un frigo
- ⚠ Les colonies deviennent énormes et ont besoin de place pour s'étendre
- ⚠ Les ouvrières peuvent piquer



Notes d'éleveurs

ASTUCE

Gardez le nid humide en permanence. Les éleveurs privilégient les nids en plâtre pour cette espèce, et un bloc d'Ytong qui sèche trop vite s'en sort mieux posé dans un bac d'eau : les fourmis peuvent ainsi choisir entre un bas détrempé et un haut plus sec.

ATTENTION

La chaleur et la sécheresse sont ce qui tue cette espèce. Une pièce chaude ou un nid qui se dessèche peut provoquer des mortalités soudaines : gardez donc la colonie dans l'endroit le plus frais de la maison et ne laissez jamais le réservoir d'eau se vider.