

Novomessor cockerelli

(André, 1893)

Une charognarde du désert aux longues pattes, dont les ouvrières s'associent pour traîner des proies bien trop grosses pour une seule fourmi.



Photo : Jake Nitta (froggy143), CC BY 4.0



En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

27–32 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

50–70 %

Dans le nid



HIBERNATION

Pas nécessaire



VOLS NUPTIAUX

juil. – août

Après la pluie



OUVRIÈRES

7–10 mm

Toutes de la même taille



REINE

11–14 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 5000 ouvrières

Croissance : Rapide




RISQUE D'ÉVASION

Moyen

Prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse




L'année en un coup d'œil



Mois dans l'aire de répartition naturelle de l'espèce. La météo décide des jours exacts, et les colonies élevées à l'intérieur peuvent suivre un autre rythme.



Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Insectes

Sucre

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Nid en acrylique
3. Installation naturaliste

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ✓ Aucune hibernation à gérer
- ⚠ Des ouvrières curieuses : prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse
- ⚠ A besoin d'une chaleur constante toute l'année



Notes d'éleveurs

ASTUCE

La chaleur est le principal levier. Gardez une partie du nid chaude et laissez un coin plus frais et plus humide : les colonies maintenues à température ambiante stagnent, alors que les colonies chauffées élèvent de nouvelles ouvrières en un mois environ. Éloignez la source de chaleur du réservoir d'eau pour éviter la condensation.

ATTENTION

Donnez plus de protéines que de graines. Les ouvrières prennent les insectes bien plus volontiers que les graines et ne constituent pas de réserves comme leurs parentes qui amassent des graines : de longues pauses entre les nourissages sont donc risquées. Certains éleveurs ont perdu des ouvrières tout juste écloses dans de petites colonies sans jamais en trouver la cause. Des proies plus grasses et plus de chaleur étaient les suggestions habituelles. Retirez les restes dans la journée, car les protéines en décomposition attirent acariens et moisissures.