

Oecophylla smaragdina

(Fabricius, 1775)

Fourmi tisserande

Des fourmis arboricoles aux longues pattes qui cousent des feuilles vivantes en nids avec la soie de leurs propres larves, et un défi d'élevage de niveau expert.



Photo : Lek Khauv, CC BY 4.0

En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

24–30 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

65–85 %

Dans le nid



HIBERNATION

Pas nécessaire



VOLS NUPTIAUX

Pas encore de données



OUVRIÈRES

5–8 mm

majors jusqu'à 10 mm



REINE

20–25 mm

Une ou plusieurs reines



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 2000 ouvrières

Croissance : Rapide



RISQUE D'ÉVASION

Élevé


Des championnes de l'évasion : utilisez une aire de chasse fermée et une bonne barrière

L'année en un coup d'œil



Mois dans l'aire de répartition naturelle de l'espèce. La météo décide des jours exacts, et les colonies élevées à l'intérieur peuvent suivre un autre rythme.

Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Installation naturaliste
2. Installation en tube à essai

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ✓ Aucune hibernation à gérer
- ⚠ Une vraie championne de l'évasion, qui demande une installation anti-évasion
- ⚠ A besoin d'une chaleur constante toute l'année

Notes d'éleveurs

ASTUCE

Construisez l'installation autour d'une plante hôte vivante et en bonne santé, aux grandes feuilles souples, comme le ficus pleureur (Ficus benjamina), le caféier ou les agrumes. Chez un éleveur, des nids sur des feuilles d'arbre à monnaie ont viré au brun et ont dû être reconstruits toutes les quelques semaines, ce qui a stressé une petite colonie, alors que des nids sur caféier et hibiscus ont tenu des mois.

ATTENTION

Lavez la plante, remplacez sa terre et laissez-la reposer un moment avant que les fourmis n'y emménagent. Les plantes de pépinière sont souvent traitées à l'insecticide, et des éleveurs ont perdu des ouvrières à cause des résidus, dans un cas avec de nouvelles plantes qui avaient été lavées, repotées et laissées pendant des mois avant d'être associées à une colonie en place.