

Pheidole pallidula

(Nylander, 1849)

Fourmi à grosse tête

De minuscules ouvrières minors, des majors à grosse tête et un vrai talent pour s'évader.



En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

21–28 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

60–70 %

Dans le nid



HIBERNATION

12–16 °C

nov. – mars



VOLS NUPTIAUX

mai – août



OUVRIÈRES

2–4 mm

majors jusqu'à 6 mm



REINE

7–8 mm

Une ou plusieurs reines



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 1000 ouvrières

Croissance : Très rapide




RISQUE D'ÉVASION

Élevé


Des championnes de l'évasion : utilisez une aire de chasse fermée et une bonne barrière

L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.

Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

Graines

MEILLEURS NIDS

1. Nid en acrylique
2. Installation naturaliste

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ✓ Fait des réserves de graines : un nourrissage manqué n'est pas un problème
- ⚠ Une vraie championne de l'évasion, qui demande une installation anti-évasion
- ⚠ Croît très vite et a besoin de beaucoup de protéines et de place

Dans mes colonies

ASTUCE

Proposez quelques petites graines à côté du sucre et des insectes : les majors à grosse tête les ouvrent pour que toute la colonie puisse manger la partie tendre à l'intérieur.

ATTENTION

Ce sont de redoutables fugueuses et les minors sont minuscules : utilisez un nid en acrylique aux couches bien serrées ou, pour une installation naturaliste, une enceinte sans interstice entre ses éléments.