

Plagiolepis pygmaea

(Latreille, 1798)

Une fourmi grosse comme une tête d'épingle, amie du soleil, qui vit en réseaux de nids à plusieurs reines et se faufile dans les moindres interstices.



Photo : Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0



En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

21–28 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

50–60 %

Dans le nid



HIBERNATION

10–15 °C

nov. – févr.



VOLS NUPTIAUX

juin – août



OUVRIÈRES

1.3–2 mm

Toutes de la même taille



REINE

3–4.5 mm

Plusieurs reines



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 5000 ouvrières

Croissance : Modérée




RISQUE D'ÉVASION

Élevé

Des championnes de l'évasion : utilisez une aire de chasse fermée et une bonne barrière




L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.



Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Nid sandwich
3. Installation en tube à essai

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ⚠ Une vraie championne de l'évasion, qui demande une installation anti-évasion



Notes d'éleveurs

ASTUCE

Proposez le sucre en traînée de miel cristallisé ou sur un minuscule morceau de papier d'aluminium, et gardez tout coton à peine humide : une seule goutte ou un bouchon détrempé peut piéger ou noyer plusieurs ouvrières à la fois.

ATTENTION

Prévoyez la barrière anti-évasion avant l'éclosion des premières ouvrières et surveillez chaque jonction : les ouvrières s'entassent dans le mince interstice entre un tube à essai et son bouchon ou un tube de liaison, et des éleveurs italiens y en ont perdu beaucoup, soit écrasées quand le plastique s'est redilaté après le repos hivernal, soit tuées par accident à l'ouverture du bouchon.