

Pogonomyrmex barbatus

(Smith, 1858)

Fourmi rouge moissonneuse

Une grande moissonneuse rouge des déserts et des prairies du sud-ouest, à la piqûre douloureuse et aux colonies qui vivent de 20 à 30 ans.



Photo : Jake Nitta (froggy143), CC BY 4.0



En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

26–32 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

50–70 %

Greniers : 30–50 %



HIBERNATION

12–16 °C

déc. – févr.



VOLS NUPTIAUX

juin – sept.

Après la pluie. Journées chaudes, Temps calme



OUVRIÈRES

6–10 mm

Toutes de la même taille



REINE

11–13 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 10 000 ouvrières

Croissance : Modérée




RISQUE D'ÉVASION

Moyen

Prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse




L'année en un coup d'œil



Mois dans l'aire de répartition naturelle de l'espèce. La météo décide des jours exacts, et les colonies élevées à l'intérieur peuvent suivre un autre rythme.



Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Graines

Insectes

Sucre

MEILLEURS NIDS

1. Installation naturaliste
2. Nid en Ytong
3. Nid en acrylique

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ✓ Fait des réserves de graines : un nourrissage manqué n'est pas un problème
- ⚠ Des ouvrières curieuses : prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse
- ⚠ Demande un gradient d'humidité, avec des greniers secs et des chambres de couvain humides
- ⚠ Les colonies deviennent énormes et ont besoin de place pour s'étendre
- ⚠ Les ouvrières peuvent piquer



Notes d'éleveurs

ASTUCE

C'est la chaleur qui les fait grandir. Gardez l'extrémité chaude du nid à environ 30 °C avec un câble ou un tapis chauffant et laissez le reste du nid plus frais. Les vendeurs rapportent que le couvain se développe beaucoup plus lentement en dessous d'environ 24 °C et que les colonies ne grandissent presque pas à température ambiante.

ATTENTION

L'eau miellée seule ne suffit pas. Un éleveur a nourri huit jeunes colonies uniquement avec de l'eau miellée, a vu leur couvain diminuer et s'est entendu conseiller de mettre à disposition des graines concassées et de donner des insectes deux à trois fois par semaine. Proposez de petites graines comme le pâturin des prés, le pissenlit ou le chia, et retirez celles qui germent ou moisissent.