

Temnothorax unifasciatus

(Latreille, 1798)

Une minuscule fourmi paisible, avec une bande sombre en travers du gaster, si petite qu'une colonie entière peut vivre dans un gland.



Photo : Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

20–26 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

50–60 %

Dans le nid



HIBERNATION

5–10 °C

nov. – mars



VOLS NUPTIAUX

juil. – août



OUVRIÈRES

2.5–3.5 mm

Toutes de la même taille



REINE

3.5–4.5 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 200 ouvrières

Croissance : Modérée




RISQUE D'ÉVASION

Moyen


Prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse

L'année en un coup d'œil



Mois pour l'Europe tempérée et la Méditerranée. La météo décide des jours exacts : les vols peuvent donc survenir plus tôt ou plus tard chez vous.

Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Nid en acrylique
3. Installation naturaliste

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ⚠ Des ouvrières curieuses : prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse
- ⚠ Demande une hibernation au froid, par exemple dans un frigo
- ⚠ Les ouvrières peuvent piquer

Notes d'éleveurs

ASTUCE

Offrez-leur des saisons plutôt qu'une pièce constamment chaude : les éleveurs décrivent une espèce robuste qui s'en sort mieux avec des nuits plus fraîches et un vrai repos hivernal. Évitez simplement que le nid lui-même ne devienne chaud et détrempé, car une installation ensoleillée et humide a coûté à un éleveur environ deux douzaines d'ouvrières et plusieurs nymphes.

ATTENTION

Ne mettez jamais de goutte libre de miel ou d'eau sucrée, car même une minuscule goutte peut piéger et noyer une ouvrière. Imbibez plutôt un morceau de coton du liquide et remplacez-le souvent.