

Aphaenogaster senilis

Mayr, 1853

Una cacciatrice inquieta dalle zampe lunghe che si diffonde dividendo la colonia anziché volando e porta a casa il cibo liquido su frammenti di detriti.



Foto: Diego González Dopico, CC BY 4.0

A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO
21–27 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO
50–65 %

Nel nido



IBERNAZIONE
12–16 °C

dic – feb



VOLI NUZIALI
Nessun volo

Fissione della colonia



OPERAIE
5–7 mm

Tutte della stessa taglia



REGINA
8–10 mm

Una sola regina



DIMENSIONE DELLA COLONIA
Raggiunge 3000 operaie

Crescita: Veloce



RISCHIO DI FUGA
Medio


Metti una barriera antifuga sull'outworld

L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi per l'Europa temperata e il Mediterraneo. Il meteo decide i tempi esatti, quindi dove vivi possono arrivare prima o dopo.

Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Insetti

Zuccheri

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

⚠ Operaie curiose: metti una barriera antifuga sull'outworld

⚠ Le operaie possono pungere

I NIDI MIGLIORI

1. Nido in Ytong
2. Setup naturalistico
3. Nido in Acrilico

Note degli allevatori

CONSIGLIO

Offri il cibo liquido con accanto qualche granello di sabbia o minuscoli pezzetti di spugna. Le operaie non riescono a passarsi i liquidi da bocca a bocca, quindi inzuppano questi frammenti e li portano alla regina e alla covata, e un allevatore ha visto invece i semplici contenitori sepolti sotto muschio e substrato.

ATTENZIONE

Non c'è alcun volo nuziale e le regine non fondano colonie da sole, quindi la specie viene venduta come frammento di colonia con regina, operaie e covata. Quando la sposti, svuota la provetta nell'area di foraggiamento anziché collegarla al nuovo nido, perché durante uno spostamento le operaie possono attaccarsi tra loro.