

Aphaenogaster subterranea

(Latreille, 1798)

Una formica di bosco snella e riservata che nidifica sotto i sassi, caccia in silenzio nella lettiera di foglie e porta a casa i liquidi dolci su granelli di terra inzuppati.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0



A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO

20–26 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO

50–65 %

Nel nido



IBERNAZIONE

8–12 °C

nov – feb



VOLI NUZIALI

lug – set



OPERAIE

3–5 mm

Tutte della stessa taglia



REGINA

7–8 mm

Una sola regina



DIMENSIONE DELLA COLONIA

Raggiunge 2000 operaie

Crescita: Moderata




RISCHIO DI FUGA

Basso

Formiche tranquille che raramente cercano di fuggire




L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi per l'Europa temperata e il Mediterraneo. Il meteo decide i giorni esatti, quindi dove vivi i voli possono arrivare prima o dopo.



Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Insetti

Zuccheri

I NIDI MIGLIORI

1. Nido in Ytong
2. Setup naturalistico
3. Nido a Sandwich

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ✓ Operaie tranquille che raramente cercano di fuggire
- ✓ Totalmente claustrale: la regina non ha bisogno di cibo finché non arrivano le prime operaie
- ⚠ Le operaie possono pungere



Note degli allevatori

CONSIGLIO

Abbi pazienza con una colonia giovane: parte lentamente, e gli allevatori segnalano solo una manciata di operaie dopo i primi mesi, poi una crescita più rapida una volta che la colonia si è stabilizzata.

ATTENZIONE

Non lasciare che l'intero nido si asciughi né che passi da un estremo all'altro. È una specie dei boschi umidi e ombrosi, e il database tedesco delle formiche segnala che la colonia si sviluppa più lentamente se è tenuta troppo asciutta, quindi mantieni una zona umida per la covata.