

Atta cephalotes

(Linnaeus, 1758)

Formica tagliafoglie

La tagliafoglie per eccellenza: operaie rosso-arancio lucide di ogni taglia portano a casa pezzi di foglia tagliati per nutrire un giardino di funghi vivo.



Foto: a6475, CC BY-SA 4.0



A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO

23-27 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO

85-95 %

Nel nido



IBERNAZIONE

Non necessaria



VOLI NUZIALI

apr – lug

Dopo la pioggia



OPERAIE

2-12 mm

maggiori fino a 18 mm



REGINA

22-30 mm

Una sola regina



DIMENSIONE DELLA COLONIA

Ancora nessun dato

Crescita: Molto veloce



RISCHIO DI FUGA

Alto

Fuggitive abilissime: usa un outworld chiuso e una buona barriera




L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi nell'areale d'origine della specie. Il meteo decide i giorni esatti, e le colonie allevate in casa possono seguire un ritmo diverso.



Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Foglie fresche

Zuccheri

I NIDI MIGLIORI

1. Nido in Acrilico
2. Setup naturalistico

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ✓ Totalmente claustrale: la regina non ha bisogno di cibo finché non arrivano le prime operaie
- ✓ Nessuna ibernazione da gestire
- ⚠ Una vera fuggitiva che richiede un setup a prova di fuga
- ⚠ Ha bisogno di un giardino di funghi nutrito ogni giorno con foglie fresche
- ⚠ Cresce molto in fretta e ha bisogno di molte proteine e di spazio



Note degli allevatori

CONSIGLIO

Assicura al fungo un ricambio d'aria, non solo dei fori nel coperchio. Il giardino emette CO2, che tende a scendere, e nella vasca di un allevatore con una sola apertura in alto il fungo veniva smantellato finché non è stata aggiunta altra ventilazione; gli allevatori esperti consigliano aperture sia in alto sia in basso. Una piccola cupola sopra il giardino permette alle formiche di creare un proprio microclima umido; tieni l'acqua liquida lontana dal fungo e non esagerare con cibi acquosi come la lattuga.

ATTENZIONE

Il caldo è un pericolo più grande di una stanza fresca, e il termometro della stanza inganna. Un allevatore ha visto il giardino ridursi settimana dopo settimana e la covata sparire dopo un'ondata di caldo in casa, e la regina di quella colonia, allevata da molto tempo, è stata poi trovata morta; altri allevatori riferiscono che il giardino si riduce ogni volta che fa troppo caldo. Metti un termometro a sonda dentro la camera del fungo, evita che i riscaldatori tocchino il giardino e prevedi un raffreddamento per l'estate.