

Camponotus japonicus

Mayr, 1866

Un robusto gigante nero opaco dei campi e dei parchi dell'Asia orientale che cresce lentamente, ma può vivere per molti anni con la stessa regina.



Foto: ippanjin, CC BY 4.0



A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO

22–28 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO

50–70 %

Nel nido



IBERNAZIONE

8–12 °C

nov – mar



VOLI NUZIALI

apr – giu

Dopo la pioggia, Giornate calde, Tempo calmo



OPERAIE

6–12 mm

maggiori fino a 14 mm



REGINA

15–18 mm

Una sola regina



DIMENSIONE DELLA COLONIA

Raggiunge 1000 operaie

Crescita: Moderata




RISCHIO DI FUGA

Medio

Metti una barriera antifuga sull'outworld




L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi nell'areale d'origine della specie. Il meteo decide i giorni esatti, e le colonie allevate in casa possono seguire un ritmo diverso.



Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Zuccheri

Insetti

I NIDI MIGLIORI

1. Nido in Ytong
2. Nido in Acrilico
3. Setup naturalistico

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ✓ Totalmente claustrale: la regina non ha bisogno di cibo finché non arrivano le prime operaie
- ⚠ Operaie curiose: metti una barriera antifuga sull'outworld



Note degli allevatori

CONSIGLIO

Offri alla colonia un riposo invernale al fresco da fine autunno a inizio primavera, per esempio in una stanza non riscaldata o in un punto ombreggiato e riparato, come fanno gli allevatori giapponesi. Le formiche si raggruppano e di solito non hanno bisogno di cibo, ma il nido non deve seccarsi, e anche le colonie tenute al caldo tendono a rallentare e a mettere in pausa la covata per un po' in inverno.

ATTENZIONE

Aspettati un inizio lento e non affrettarti a mettere la colonia in un nido grande: alle formiche non piace un nido decisamente troppo grande, e alcune giovani colonie in cattività restano ferme per mesi. Passa a spazi più grandi a piccoli passi, una volta che covata e operaie riempiono lo spazio attuale.