

Camponotus lateralis

(Olivier, 1792)

Una piccola e timida formica carpentiera dalla testa rossa e dal gaster nero che si finge una formica acrobata e ne segue le piste per trovare cibo.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO
21–27 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO
40–60 %

Nel nido



IBERNAZIONE
8–12 °C

nov – feb



VOLI NUZIALI
apr – mag

Giornate calde, Tempo calmo



OPERAIE
3–7 mm

Molte taglie



REGINA
8–10 mm

Una sola regina



DIMENSIONE DELLA COLONIA
Raggiunge 1000 operaie


Crescita: Moderata



RISCHIO DI FUGA
Medio


Metti una barriera antifuga sull'outworld

L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi per l'Europa temperata e il Mediterraneo. Il meteo decide i giorni esatti, quindi dove vivi i voli possono arrivare prima o dopo.

Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Zuccheri

Insetti

I NIDI MIGLIORI

1. Nido in legno
2. Nido in Ytong
3. Nido in Acrilico

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ✓ Totalmente claustrale: la regina non ha bisogno di cibo finché non arrivano le prime operaie
- ⚠ Operaie curiose: metti una barriera antifuga sull'outworld

Note degli allevatori

CONSIGLIO

Dai alla colonia un nido compatto, asciutto e caldo e una fonte d'acqua separata. Proviene da boschi mediterranei asciutti e soleggiati e non ama l'umidità, e la colonia di un allevatore teneva la covata in un angolo lontano dalla parte umida del nido.

ATTENZIONE

Abbi pazienza con le regine fondatrici. È una specie che parte lentamente e può impiegare molto tempo a deporre, e il primo gruppo di operaie è piccolo. Gli allevatori consigliano di lasciare una giovane colonia nella sua provetta, con la sua riserva d'acqua, per i primi inverni anziché affrettarsi a trasferirla in un nido.