

Formica sanguinea

Latreille, 1798

Formica sanguigna

Una razziatrice audace, rossa e nera, che ruba le pupe di altre Formica per farne delle aiutanti, e un progetto per allevatori che conoscono già le basi.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO

21-26 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO

50-60 %

Nel nido



IBERNAZIONE

5-8 °C

ott – mar



VOLI NUZIALI

giu – ago



OPERAIE

6-9 mm

Tutte della stessa taglia



REGINA

9-11 mm

Una o più regine



DIMENSIONE DELLA COLONIA

Raggiunge 5000 operaie

Crescita: Veloce




RISCHIO DI FUGA

Alto

Fuggitive abilissime: usa un outworld chiuso e una buona barriera




L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi per l'Europa temperata e il Mediterraneo. Il meteo decide i giorni esatti, quindi dove vivi i voli possono arrivare prima o dopo.



Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Zuccheri

Insetti

I NIDI MIGLIORI

1. Nido in Ytong
2. Setup naturalistico
3. Nido a Sandwich

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ⚠ Una vera fuggitiva che richiede un setup a prova di fuga
- ⚠ Parassita sociale: la regina ha bisogno di operaie ospiti per iniziare
- ⚠ Richiede un'ibernazione al freddo, per esempio in frigorifero



Note degli allevatori

CONSIGLIO

Usa Formica fusca come ospite: condivide l'habitat aperto e asciutto di questa specie ed è quella che offrono i negozi e usa la maggior parte degli allevatori. Funziona anche Formica cunicularia, mentre Camponotus, le formiche rosse dei boschi e tutte le Myrmicinae non sono ospiti adatti.

ATTENZIONE

Una razzia può spazzare via una piccola colonia ospite in una sola notte, e in un contenitore chiuso l'acido formico può accumularsi e uccidere le aiutanti. Collega una colonia ospite solo se puoi permetterti di perderla, usa un'arena spaziosa e ventilata in cui puoi interrompere il collegamento in qualsiasi momento e resta nei paraggi mentre succede.