

Harpegnathos venator

(Smith, 1858)

Una cacciatrice dalla vista acuta e dalle mandibole a falce, che si immobilizza, agita il gaster e poi balza sulla preda viva.



Foto: portioi, CC BY 4.0



A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO

24–28 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO

60–80 %

Nel nido



IBERNAZIONE

Non necessaria



VOLI NUZIALI

Ancora nessun dato

Dopo la pioggia



OPERAIE

14–18 mm

Tutte della stessa taglia



REGINA

16–20 mm

Una o più regine



DIMENSIONE DELLA COLONIA

Raggiunge 400 operaie

Crescita: Moderata



RISCHIO DI FUGA

Medio

Metti una barriera antifuga sull'outworld




L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi nell'areale d'origine della specie. Il meteo decide i giorni esatti, e le colonie allevate in casa possono seguire un ritmo diverso.



Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Insetti

I NIDI MIGLIORI

1. Nido in Ytong
2. Setup naturalistico
3. Setup in Provetta

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ✓ Nessuna ibernazione da gestire
- ⚠ Operaie curiose: metti una barriera antifuga sull'outworld
- ⚠ Semi-claustrale: la regina fondatrice va nutrita
- ⚠ Ha bisogno di calore costante tutto l'anno
- ⚠ Le operaie possono pungere



Note degli allevatori

CONSIGLIO

Dai al nido un calore costante e camere umide, e tieni l'arena più asciutta. Gli allevatori che si sono affidati alla temperatura ambiente fresca riferiscono una covata a sviluppo lento e pupe aperte e mangiate prima della nascita, mentre la maggior parte dei resoconti più recenti di colonie in salute riguarda un nido riscaldato o una stanza calda.

ATTENZIONE

Offri solo prede vive. In una prova sul campo le operaie non hanno attaccato scarafaggi uccisi con acqua bollente, e la maggior parte degli allevatori riferisce che le colonie ignorano gli insetti morti. Funzionano piccoli grilli vivi o ninfe di blatta, alcuni allevatori tolgono ai grilli le zampe posteriori da salto perché le formiche riescano a catturarli, e se la colonia ignora una specie provane un'altra: una colonia ha rifiutato i grilli domestici ma ha portato dritta nel nido un'altra specie di grillo.