

# Lasius alienus

(Foerster, 1850)

Un piccolo Lasius marrone e schivo dei prati caldi e aridi e dei terreni calcarei, facile da scambiare per la formica nera dei giardini.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

## A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO  
**21–25 °C**

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO  
**50–60 %**

Nel nido



IBERNAZIONE  
**5–8 °C**

ott – mar



VOLI NUZIALI  
**lug – set**



OPERAIE  
**2–4 mm**

Tutte della stessa taglia



REGINA  
**7–9 mm**

Una sola regina



DIMENSIONE DELLA COLONIA  
**Raggiunge 5.000 operaie**


Crescita: Moderata



RISCHIO DI FUGA  
**Medio**


Metti una barriera antifuga sull'outworld

## L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi per l'Europa temperata e il Mediterraneo. Il meteo decide i giorni esatti, quindi dove vivi i voli possono arrivare prima o dopo.

## Dimensioni sulla stessa scala



## La cura in breve

### ALIMENTAZIONE

Zuccheri

Insetti

### I NIDI MIGLIORI

1. Nido a Sandwich
2. Nido in Ytong
3. Nido in Acrilico

### PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ✓ Totalmente claustrale: la regina non ha bisogno di cibo finché non arrivano le prime operaie
- ⚠ Operaie curiose: metti una barriera antifuga sull'outworld
- ⚠ Richiede un'ibernazione al freddo, per esempio in frigorifero

## Note degli allevatori

### CONSIGLIO

L'allevamento è molto simile a quello di *Lasius niger*: la regina claustrale non ha bisogno di cibo finché non nascono le sue prime operaie, poi offri acqua zuccherata o miele e piccoli insetti come i moscerini della frutta. In un resoconto di allevamento tedesco le operaie portavano volentieri piccole prede nel nido, ma dopo le prime settimane visitavano il miele solo di tanto in tanto.

### ATTENZIONE

Controlla l'identificazione prima di organizzarti di conseguenza. Le regine fondatrici si confondono facilmente con *Lasius niger*, e gli utenti esperti dei forum dicono che questa formica non si può identificare dalle foto. Aspetta le operaie di taglia normale e osserva diverse sotto una lente di forte ingrandimento, perché le minuscole prime operaie hanno meno peli. Fino ad allora, chiama la colonia *Lasius cf. alienus*.