

Manica rubida

(Latreille, 1802)

Una grande cacciatrice di montagna rosso ruggine che accumula monticelli a forma di cratere intorno agli ingressi del nido, punge come una vespa e non perdona gli errori nella fase di fondazione.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO
20–28 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO
50–70 %

Nel nido



IBERNAZIONE
5–10 °C

ott – mar



VOLI NUZIALI
apr – giu

Giornate calde



OPERAIE
5–9 mm

Tutte della stessa taglia



REGINA
10–13 mm

Una o più regine



DIMENSIONE DELLA COLONIA
Raggiunge 3000
operaie


Crescita: Veloce



RISCHIO DI FUGA
Medio


Metti una barriera antifuga sull'outworld

L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi per l'Europa temperata e il Mediterraneo. Il meteo decide i giorni esatti, quindi dove vivi i voli possono arrivare prima o dopo.

Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Zuccheri

Insetti

I NIDI MIGLIORI

1. Nido in Ytong
2. Setup naturalistico
3. Setup in Provetta

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ⚠ Operaie curiose: metti una barriera antifuga sull'outworld
- ⚠ Semi-claustrale: la regina fondatrice va nutrita
- ⚠ Le operaie possono pungere

Note degli allevatori

CONSIGLIO

Offri un gradiente da umido ad abbastanza asciutto invece di un nido inzuppato. Un allevatore che aveva dato a una colonia tre camere da bagnata a quasi asciutta l'ha trovata a vivere in quella più asciutta, ma anche le colonie piccole sono molto sensibili a un nido che si asciugua.

ATTENZIONE

Le regine fondatrici cacciano per conto proprio, quindi assicurati che possano raggiungere il cibo fin dal primo giorno: un piccolo outworld o un'alimentazione molto regolare e, quando compaiono le prime larve, un piccolo pezzo di proteine che lei possa trasportare almeno una volta al giorno. Gli allevatori che hanno allevato molte colonie in questa fase nutrono una o due volte al giorno.