

Messor ebeninus

Santschi, 1927

Una formica mietitrice del Medio Oriente, nera come l'ebano e lucida, che conserva i semi ai piani alti e alleva la covata nel terreno umido molto più in basso.



Foto: Moshe Neeman (מוֹשֶׁה נֶעֱמָן, moshe_neeman), CC BY 4.0



A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO

22–28 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO

50–60 %

Granai dei semi: 30–50 %



IBERNAZIONE

15–18 °C

gen – feb



VOLI NUZIALI

nov – dic

Dopo la pioggia



OPERAIE

4–8 mm

maggiori fino a 10 mm



REGINA

11–12 mm

Una sola regina



DIMENSIONE DELLA COLONIA

**Raggiunge 5000
operaie**

Crescita: Moderata



RISCHIO DI FUGA

Basso

Formiche tranquille che raramente cercano di fuggire




L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi nell'areale d'origine della specie. Il meteo decide i giorni esatti, e le colonie allevate in casa possono seguire un ritmo diverso.



Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Semi

Insetti

Zuccheri

I NIDI MIGLIORI

1. Nido in Ytong
2. Nido in Acrilico
3. Setup naturalistico

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ✓ Operaie tranquille che raramente cercano di fuggire
- ✓ Totalmente claustrale: la regina non ha bisogno di cibo finché non arrivano le prime operaie
- ✓ Accumula semi, quindi un pasto saltato non è un problema
- ⚠ Ha bisogno di un gradiente di umidità, con granai asciutti e camere della covata umide



Note degli allevatori

CONSIGLIO

Riproduci i due piani del nido selvatico: una parte superiore asciutta per la scorta di semi e una parte inferiore umida per la regina e la covata. In un nido in Ytong o in gesso, bagna solo un'estremità e lascia asciutta l'altra.

ATTENZIONE

Una regina catturata dopo il volo autunnale depone solo a fine inverno, quindi una provetta senza uova per mesi è normale. Poi una giovane colonia cresce lentamente: in quello studio aveva solo qualche decina di operaie l'autunno successivo.