

Messor wasmanni

Krausse, 1910

Una raccoglitrice di semi dalla testa grossa delle praterie soleggiate d'Italia e dei Balcani, con ordinate piste verso il nido e un nome che si scrive ancora con un prudente cf.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0



A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO

22-26 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO

50-70 %

Granai dei semi: 30-50 %



IBERNAZIONE

12-15 °C

dic – feb



VOLI NUZIALI

set – nov

Dopo la pioggia



OPERAIE

4-8 mm

maggiori fino a 10 mm



REGINA

12-14 mm

Una sola regina



DIMENSIONE DELLA COLONIA

**Raggiunge 5000
operaie**

Crescita: Moderata



RISCHIO DI FUGA

Basso

Formiche tranquille che raramente cercano di fuggire




L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi per l'Europa temperata e il Mediterraneo. Il meteo decide i giorni esatti, quindi dove vivi i voli possono arrivare prima o dopo.



Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Semi

Insetti

Zuccheri

I NIDI MIGLIORI

1. Nido in Ytong
2. Nido in Acrilico
3. Setup naturalistico

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ✓ Operaie tranquille che raramente cercano di fuggire
- ✓ Totalmente claustrale: la regina non ha bisogno di cibo finché non arrivano le prime operaie
- ✓ Accumula semi, quindi un pasto saltato non è un problema
- ⚠ Ha bisogno di un gradiente di umidità, con granai asciutti e camere della covata umide



Note degli allevatori

CONSIGLIO

Offri ogni tanto spighe intere di graminacee con i semi, non solo semi sciolti: in natura queste formiche raccolgono i semi direttamente dalla pianta oltre che da terra.

ATTENZIONE

Una regina catturata dopo il volo autunnale di solito comincia a deporre solo in primavera, dopo il riposo invernale, quindi una provetta dall'aspetto vuoto per tutto l'inverno è normale. Tieni la provetta al buio e in pace invece di controllare la regina.